

Sehr geehrte Kollegen,

besten Dank für die freundliche Überweisung der o.g. Patientin.

Klinische Angaben:

seit 1,5a rezidivierende Schmerzen im Bereich der rechten Gl. parotis, aktuell akut

Fragestellung:

Korrelat

Untersuchung:

MR-HWT nativ vom 15.05.2009/19:13 Uhr

Technik:

Survey, Sc;Head-Neck
;;;TSE;T 2;cor. nativ
;;;TSE;T 1;cor. nativ
;;;TIRM;;transv. nativ;FS
;;;TIRM;;cor. nativ;FS
;;;EPI;Diffusion;transv. nativ

Befund:

Es liegen keine Voraufnahmen zum Vergleich vor.

- Zahlenmässig vermehrte und entzündlich-reaktiv vergrößerte Lymphknoten im rechten Kieferwinkel.
- 12 mm messender Lymphknoten (Bestätigung der Diagnose LK durch diffusionsgewichtete Darstellung mit Diffusibilität von 0,7 mm²/s) intraparotideal rechts am caudalen Pol.
- Sonst keine wegweisende Pathologie.

Beurteilung:

Intraparotidaler Lymphknoten rechts. Dieser ebenso wie Lymphknoten im rechten Kieferwinkel entzündlich-reaktiv geschwollen und vermutlich durch Druck auf die Organkapsel ursächlich für die klinische Symptomatik. Sonografische Korrelation und Verlaufskontrollen empfohlen.

MRT-Befund der Halsweichteile