

*Lesen Sie den Beipackzettel für das Arzneimittel:*

## **LOSARTAN HEXAL® 100 mg Filmtabletten**

Wirkstoff: Losartan-Kalium

### **1 Was ist Losartan HEXAL® 100 mg und wofür wird es angewendet?**

Losartan gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten bezeichnet werden. Die Substanz Angiotensin-II wird in Ihrem Körper gebildet und bindet an Rezeptoren in den Blutgefäßen und lässt diese enger werden. Dadurch steigt der Blutdruck. Losartan blockiert die Bindung von Angiotensin-II an diese Rezeptoren, so dass die Blutgefäße entspannt werden und Ihr Blutdruck sinkt. Losartan verlangsamt die Verschlechterung der Nierenfunktion bei Patienten mit hohem Blutdruck und Typ-2-Diabetes.

.....

### **2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Losartan HEXAL® 100 mg beachten?**

**Losartan HEXAL® 100mg** darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Losartan oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- wenn Ihre Leberfunktion deutlich eingeschränkt ist.
- Während der letzten 6 Monate einer Schwangerschaft. ...

.....

### **3 Wie ist Losartan HEXAL® 100 mg einzunehmen?**

**Einnahme**

Die Tabletten sollten mit einem Glas Wasser geschluckt werden. Versuchen Sie, **Losartan HEXAL® 100 mg** täglich zur gleichen Zeit einzunehmen.

#### **Erwachsene Patienten mit Bluthochdruck**

Die Behandlung beginnt üblicherweise mit ½ Filmtablette **Losartan HEXAL® 100 mg** (entsprechend 50 mg Losartan) 1-mal täglich. Die maximale blutdrucksenkende Wirkung wird etwa 3-6 Wochen nach Behandlungsbeginn erreicht.

Bei einigen Patienten kann die Dosis auf 1 Filmtablette **Losartan HEXAL® 100 mg** (entsprechend 100 mg Losartan) 1-mal täglich erhöht werden.

#### **Bei Einnahme von Losartan HEXAL® 100 mg mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, pflanzliche Arzneimittel oder Naturprodukte handelt.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie zusätzlich zur Behandlung mit **Losartan HEXAL® 100 mg** eines der folgenden Arzneimittel anwenden:

- andere Arzneimittel zur Behandlung des Bluthochdrucks, da sie den Blutdruck zusätzlich senken können. ...

.....

#### **4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann **Losartan HEXAL® 100 mg** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Falls folgende Beschwerden auftreten, nehmen Sie Losartan nicht mehr ein und informieren Sie sofort Ihren Arzt oder begeben Sie sich in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses:

Eine schwer wiegende allergische Reaktion (Hautausschlag, Juckreiz, Schwellung von Gesicht, Lippen, Mund oder Rachen, die Schluck- oder Atembeschwerden verursachen kann).

Dies ist eine schwer wiegende, aber seltene Nebenwirkung ...

Häufig:

- Schwindel
- niedriger Blutdruck
- Schwächegefühl
- Müdigkeit
- zu niedriger Blutzucker (Hypoglykämie)
- zu viel Kalium im Blut (Hyperglykämie)

.....

[Auszug aus der Packungsbeilage für das Arzneimittel **Losartan HEXAL® 100 mg**, Hexal AG Holzkirchen, Überarbeitung März 2010]